

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 - الموضوع -

المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني  
والتعميم والبحث العلمي  
المركز الوطني للتقديم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

RS 22

3	مدة الإنجاز	<b>الرياضيات</b>	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية	الشعبة أو المسلك

تعليمات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛
  - يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛
  - ينبغي تفادى استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة .

## مكونات الموضوع

يتكون الموضوع من ثلاثة تمارين و مسألة، مستقلة فيما بينها، و توزع حسب المجالات كما يلى:

التمرين الأول	المتاليات العددية	2 نقط
التمرين الثاني	الأعداد العقدية	5 نقط
التمرين الثالث	الاشتقاق و حساب التكامل	4 نقط
المسألة	دراسة دالة عددية و متالية عددية	9 نقطة

- نرمز بـ  $\mathbb{Z}$  لمعيار العدد العقدي  $\mathbb{Z}$  و بـ  $\overline{\mathbb{Z}}$  لمراافق  $\mathbb{Z}$
  - $\ln$  يرمز لدالة اللوغاريتم التبيرى



للمزيد من الدروس و الملخصات تفضلوا بزيارةتنا  
[www.tahmilsoft.com](http://www.tahmilsoft.com)

## التمرين الأول (2 نقطه):

لتكن المتتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة كما يلي:  $u_0 = 1$  و  $u_{n+1} = \frac{3u_n - 8}{2u_n - 5}$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

(1) بين أن  $u_n < 2$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

0.5

(2) نضع  $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n - 2}$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

0.5

أ- بين أن  $(v_n)$  متتالية حسابية أساسها 2

ب- اكتب  $v_n$  بدالة  $n$  واستنتج  $u_n$  بدالة  $n$

0.75

ج- احسب نهاية المتتالية  $(u_n)$

0.25

## التمرين الثاني (5 نقطه):

(1) حل في مجموعة الأعداد العقدية  $\boxed{\quad}$  المعادلة:  $z^2 - \sqrt{2}z + 1 = 0$

0.75

(2) نضع  $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$

0.75

أ) أكتب  $a$  على الشكل المثلثي واستنتاج أن  $a^{2020}$  عدد حقيقي

ب) ليكن العدد العقدي  $b = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$  ، أثبت أن  $b^2 = a$

0.5

(3) في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  ، نعتبر النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  التي أحقها على التوالي هي  $a$  و  $b$  و  $c$  حيث  $c = 1$ . ليكن  $R$  الدوران الذي مركزه  $O$  و زاويته  $\frac{\pi}{8}$  والذي يحول النقطة  $M$  ذات اللحق  $z$

إلى النقطة '  $M$  ذات اللحق '  $z'$   
أ- تحقق ان  $z' = bz$

0.25

ب- حدد صورة النقطة  $C$  بالدوران  $R$  و بين أن النقطة هي  $A$  صورة النقطة  $B$  بالدوران  $R$

0.5

(4) أ- بين أن  $|a-b| = |b-c|$  ثم استنتاج طبيعة المثلث  $ABC$

0.75

ب- حدد قياساً للزاوية  $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$

0.5

(5) نعتبر  $T$  الإزاحة ذات المتجهة  $\vec{u}$  و لتكن النقطة  $D$  صورة النقطة  $A$  بالإزاحة  $T$

أ- تتحقق ان لحق النقطة  $D$  هو العدد العقدي  $b^2 + 1$

0.25

ب- بين أن  $\frac{b^2 + 1}{b} = b + \bar{b}$  واستنتاج ان النقط  $O$  و  $B$  و  $D$  مستقيمية

0.75

## التمرين الثالث (4 نقطه):

نعتبر الدالة العددية المعرفة على  $\boxed{\quad}$  بما يلي :

(1) أ- بين ان لكل  $x$  من  $\boxed{\quad}$ :  $u'(x) = \frac{(e^x - 1)^2 + 2}{e^x}$

0.5

ب- ضع جدول تغيرات الدالة  $u$  (حساب النهايات غير مطلوب)

0.25

ج- استنتاج إشارة الدالة  $u$  على  $\boxed{\quad}$  (لاحظ ان  $u(0) = 0$ )

0.5

(2) لتكن الدالة  $v$  المعرفة على  $\boxed{\quad}$  بـ :  $v(x) = e^{2x} - 2xe^x + 2e^x - 3$

أ- تتحقق من أن $v(x) = e^x u(x)$ لكل $x$ من $\square$	0.5
ب- استنتج إشارة الدالة $v$ على $\square$	0.5
(3) أ- بين أن الدالة $W$ المعرفة بـ: $W(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + (4-2x)e^x - 3x$ هي دالة أصلية لدالة $v$ على $\square$	0.5
ب- أحسب التكامل $\int_0^2 v(x)dx$	0.5
ج- بين أن $\frac{9}{2}$ هي القيمة الدنيا المطلقة لدالة $W$ على $\square$	0.75
المسألة (9 نقطة) :	
I - لتكن $g$ الدالة العددية المعرفة على $[0, +\infty]$ كما يلي :	
(1) بين أن $\forall x \in [0, +\infty[$ , $g'(x) < 0$	0.5
(2) استنتاج جدول إشارة $(g)$ على المجال $]0, +\infty[$ (لاحظ أن $g(1) = 0$ )	0.5
II - نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على $[0, +\infty]$ بما يلي :	
و $(C)$ المنحني الممثل لدالة $f$ في معلم متواحد منظم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (الوحدة $2 \text{ cm}$ )	
(1) أثبت أن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ثم أول النتيجة هندسيا	0.5
(2) أ) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	0.5
ب) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ ثم أول النتيجة هندسيا	0.75
(3) أ) بين أن $(f')$ على المجال $[0, +\infty[$ تقبل حلها وحيدا في المجال $]0, +\infty[$ (أ) $f'(x) = (x-2)g(x)$ لكل $x$ من $\square$	1
ب) بين أن الدالة $f$ تناقصية على $[1, 2]$ وعلى $[0, 1]$ وأنها تزايدية على المجال $[1, 2]$	0.75
ج) ضع جدول تغيرات الدالة $f$ على المجال $[0, +\infty]$ ( $f(2) = 1,25$ ) ( نقبل أن $f(0) = 0,5$ )	0.25
(4) علما أن $f(3) = 0,9$ و $f(4) = -1,9$ برهن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلها وحيدا في المجال $[3, 4]$	0.5
(5) أنشئ المنحني $(C)$ في المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$	1
III- نضع $h(x) = f(x) - x$ لكل $x$ من المجال $[1, 2]$	
- أ) انطلاقا من جدول تغيرات الدالة $h$ جانبه بين أن $f(x) \leq x$ لكل $x$ من المجال $[1, 2]$	0.5
(b) بين أن 1 هو الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = x$ على المجال $[1, 2]$	0.25
(2) لتكن المتالية العددية $(u_n)$ المعرفة كما يلي : $u_{n+1} = f(u_n)$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$	
أ) بين بالترجع أن لكل $n$ من $\mathbb{N}$ $1 \leq u_n \leq 2$	0.75
ب) بين أن المتالية $(u_n)$ تناقصية	0.5
ج) استنتاج أن المتالية $(u_n)$ متقاربة ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	0.75

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2020 - عناصر الإجابة -

# SSSSSSSSSSSSSSSSSS

NR 22



†.ЖИЛЕТ | НСЧОЕО  
С.Л.ОТ | 190ХХХ | 1930  
Λ 200XX | ΣΤΙΧΟΙ  
ΘΕΑΤΡΟΥ | Λ 200XX | Σ.Λ.

المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني  
والتعليم العالى والبحث العلمى  
**المركز الوطنى**

3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية و مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية	الشعبة أو المسلح

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة الاستدراكية 2020

### - عناصر الإجابة -

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

RR 22



3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية و مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية	الشعبة أو المسلك

- تؤخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل الحل وتقبل كل طريقة صحيحة تؤدي إلى الحل -

التمرین	رقم السؤال	التنقيط	عناصر الإجابة
التمرین الأول	1	0.5	
	أ-2	0.5	
	ب-2	0.75	0.25 لصيغة $u_n$ و 0.5 لصيغة $v_n$
	ج - 2	0.25	
التمرین الثاني	1	0.75	0.25 للمميز و 0.25 لكل حل
	أ-2	0.75	0.25 للشكل المثلثي و 0.5 للإستنتاج
	ب-2	0.5	
	أ-3	0.25	
التمرین الثالث	ب-3	0.5	0.25 لكل صورة
	أ-4	0.75	0.5 للمتساوية و 0.25 للإستنتاج
	ب-4	0.5	
	أ-5	0.25	
	ب-5	0.75	0.25 للمتساوية و 0.5 للإستنتاج
	أ-1	0.5	
	ب-1	0.25	
	ج-1	0.5	
	أ-2	0.5	
	ب-2	0.5	
	أ-3	0.5	
	ب-3	0.5	
	ج-3	0.75	

ال詢مین	رقم السؤال	التنقيط	عناصر الإجابة
	1 ( I )	0.5	
	2	0.5	
	1 ( II )	0.5	0.25 للنهاية و 0.25 للتaylor
	أ-2	0.5	
	ب-2	0.75	0.5 للنهاية و 0.25 للتaylor
	أ-3	1	
	ب-3	0.75	0.25 للرتبة على كل مجال
	ج-3	0.25	
	4	0.5	
	5	1	أنظر المبيان أسفله
المسئلة	أ-1 ( III )	0.5	
	ب-1	0.25	
	أ - 2	0.75	
	ب-2	0.5	
	ج - 2	0.75	0.5 لتبرير التقارب و 0.25 لحساب النهاية

